



KRAJINSKI PARK
**Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib**

Strokovni posvet: Nabiranje in varstvo gliv
Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 23.-24. 9. 2021

Luka Šparl, višji naravovarstveni svetovalec



**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

MNENJA IN IZKUŠNJE SLOVENSКИH KRAJINSKIH IN REGIJSKIH PARKOV GLEDE MASOVNEGA NABIRALNIŠTVA




Pogled na sv. Jakob

foto: Luka Šparl

ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE V SLOVENIJI SKUPNOST NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE

SEZNAM VSEH PARKOV





Krajinski park Goričko
velikost območja: 46200 ha

Stavbna kulturna dediščina v Kobilju.

foto: Luka Šparl



Značilne gobe Goričkega

foto: Luka Šparl



Najbolj iskani lističarki na Goričkem.

foto: Luka Šparl

Regijski park Škocjanske jame

velikost območja: 401 ha

Gozdna krajina pri Matavunu.

foto: Luka Šparl



Gabrov dedek (*Leccinellum pseudoscabrum*)
foto: Luka Šparl



Hrapava mušnica (*Amanita franchetii*) in
grbičasti dežnik (*Macrolepiota mastoidea*).

foto: Luka Šparl



Notranjski regijski park
velikost območja: 22.200 ha

Cerkniško jezero in Slivnica

foto: Luka Šparl



Dinarski gozdovi

Cerkniško polje

foto: Luka Šparl



Vrste gob Notranjskih gozdov.

foto: Luka Šparl

Regijski park Kozjanski park
velikost območja: 20.600 ha



Trg Podsreda

foto: Luka Šparl



Kozjansko je bogato z gobami iz rodu dežnikov.

foto: Luka Šparl

Ekstenzivna travnišča na Kozjanskem



Pestrost gliv vlažnic, bioindikatorjev
čistega neonesnaženega okolja

foto: Luka Šparl

Krajinski park Pivška presihajoča jezera
velikost območja: 14.000 ha

Petelinjsko jezero

foto: Luka Šparl



Grbičasti dežniki (*Macrolepiota mastoidea*) na ekstenzivnih travnikih.

foto: Luka Šparl



Zimski puhar (*Tulostoma brumale*)

foto: Luka Šparl

Krajinski park Strunjan
velikost območja: 42.900 ha

Mesečev zaliv

foto: Luka Šparl



Navadna mrežnica (*Clathrus ruber*)
foto: Luka Šparl

RS, Z!

Pestrost poletnih gob na Primorskem.



Določanje gob s pomočjo mikroskopa na raziskovalnem taboru študentov biologije.

foto: Luka Šparl



Krajinski park Ljubljansko barje
velikost območja: 13.505 ha.

Močvirske logarice (*Fritillaria melleagris*) pri Strejaci.

foto: Luka Šparl



Mikološka ekipa na BIOBLITZ-u 2017 v Dragi pri Igu

foto: Luka Šparl



Dve zaprtotrošnici, novi vrsti za Slovenijo, najdeni na BIOBLITZ-u 2017.
Hyalorbilia inflatula in *Scutellinia crucipila* (levo zgoraj).

foto: Luka Šparl

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

velikost območja: 459,4 ha





Poletni goban (*Boletus reticulatus*)

foto: Luka Šparl



Skupina črnomekinastih mraznic (*Armillaria ostoyae*)

foto: Luka Šparl



Rdečkasti mušnici (*Amanita rubescens*)

foto: Luka Šparl



Borov glivec (*Sparassis crispa*)

foto: Luka Šparl

First records of two ascomycete fungi (Ascomycota) for Slovenia

Luka ŠPARL¹, Eva ZUPAN²



Ozkotroсна žebllarka (*Cudoniella tenuispora*) in temnoroba potočka (*Vibrisea filisporia*) (levo zgoraj), novi vrsti za Slovenijo v letu 2019.

foto: Luka Šparl



Ohranjanje mokrišč je ključno za ohranjanje številnih vrst gliv!

Tri vrste, vezane na neonesnaženo vodno okolje. Potočna žebljarka (*Cudoniella clavus*), močvirska kapica (*Mitrula paludosa*) (levo zgoraj), oranžna potočka (*Vibrissea truncorum*) (levo v sredini).

foto: Luka Šparl